




# በአንድ የቡና ማሳ ላይ የብዝህ ሕይወት ተጠብቆ ቡና ማምረት ይቻላል?

ቡና በተለያዩ የጥላ ዛፍ ዝረያዎች ጥቅጥቅ ባለ የደን ሽፋን ስር ሲበቅል ለብዙ ወፎች፣ አበቦች እና ነፍሳት ተስማሚ አካባቢ ይፈጥራል። ነገር ግን አርሶ አደሩ ከፍተኛ ምርት ለማግኘት የግብርና ግብአቶችን በመጠቀም የማሳውን አያያዝ ማጠናከር ከፈለገ ለዕጮትና እንስሳት መኖሪያነት ያለው የማሳው ጥራት ሊቀንስ ይችላል። ይህንን በተለያዩ ግቦች መካከል ያለውን ግጭት ማለትም ብዝህ ህይወትን መጠበቅ ወይም ማሻሻል ወይም የቡና ምርትን መጨመር አጥንተናል። በጣም ዝቅተኛ የቡና ምርት ያላቸው ጫካማ ቦታዎች ለዱር እጮት ከፍተኛ ዋጋ እንዳላቸው የጥናታችን ውጤት ያሳያል። ይህ ማለት የደን ቡና አያያዝን ማጠናከር የብዝህ ህይወት መጥፋት ያስከትላል። ይሁንና ትንሽ ከፍ ያለ ምርት በሚሰጡ ቦታዎች ላይ ምርትን እና ብዝሃ ህይወትን ለመጨመር ዕድሎች ሊኖሩ የሚችሉ ይመስላል። ስለሆነም ገበሬዎች ምርትን እና ብዝሃ ህይወትን በአንድ ጊዜ የማሻሻል ዘዴዎችን እንዲሞክሩ እናበረታታለን።

## ሊጋጩ የሚችሉ ግቦች

ኢትዮጵያ ውስጥ ቡና በአጠቃላይ በአገር በቀል ዛፎች ጥላ ሥር ይበቅላል። የዛፎች መኖር በራሱ ለብዙ ሌሎች ዝረያዎች አዎንታዊ ተፅዕኖ ይኖረዋል። ለምሳሌ፣ የዛፍን ጥላ ሽፋን ቀና ብለው ከተመለከቱት ከቅርንጫፎቹ ላይ የተንጠለጠሉ አበቦችን ማየት ይችላሉ፤ እንዲሁም ማለዳ ላይ የተለያዩ የወፎች ዘፈንና የሚያፏጩ ነፍሳቶችንና የተለያዩ እንስሳቶችን ማራኪ ድምፅ ይሰማሉ (ምስል 1)። በዚህ ምክንያት ጥላ ሥር የሚበቅሉ የቡና እርሻዎች በመልክዓ ምድሩ ውስጥ ለብዝህ ሕይወት አስፈላጊ ቦታዎች ናቸው። ይሁን እንጂ የቡና አምራች ግን ከእንስሳት ወይም ከዕጮት ብዝህ ሀብት መጠን ይልቅ ከምርቱ ገንዘብ

በማግኘት ላይ ሊያተኩሩ ይችላሉ። የቡና እንክብካቤም በቡና አምራቾች መካከል ይለያያል። አንዳንዶቹ ቡናን ከተፈጥሮ ደን ወይም ጫካ ሲለቅሙ፣ ሌሎች ደግሞ ከቤተሰቦቻቸው በወርስ ከተረከቡት የቡና ማሳ ቡናን በባህላዊ መንገድ ያመርታሉ፤ የተቀሩት ደግሞ በዘመናዊ ሁኔታ የግብርና ግብአቶችን በመጠቀም እና ብዙ ጊዜያቸውን እዚህ ሥራ ላይ በማዋል ምርቱን ለማሳደግ ይሞክራሉ። ይህ የቡና ማሳ እንክብካቤ ልዩነት የዛፍን ሽፋን እና የጥላ ዛፎች ስብጥር ላይ ተፅዕኖ ያሳድራል፤ ይህ ደግሞ የብዝህ ህይወት ስብጥር/ቅንብር ላይ ተፅዕኖ ይኖረዋል።




ምስል 1. በጥላ ዛፍ ስር የሚያደግ ቡና ለተለያዩ ዕጮትና እንስሳቶችም መኖሪያ ነው። በዛፎች፣ ግንድ አልባ ተክሎች ወይም ቅጠላ ቅጠሎች እና ብራዮፊቶች ላይ ትኩረት አድርገናል (የመጀመሪያው ረድፍ)።

**በ60 የቡና እርሻዎች ላይ ምርትና ብዝሃ ሕይወት**

ጥናታችን ትኩረት ያደረገው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በጂማ ዞን በጌራና ጎማ ወረዳዎች ቡናን በሚያመርቱ 60 የተለያዩ እርሻዎች ላይ ነበር። በእያንዳንዱ ቡና እርሻ ውስጥ ዛፎችን፣ ቁጥቋጦዎችን፣ ግንድ አልባ እፅዋቶችን (በዛፎች ላይ ያሉትን ጨምሮ) እና ብራዮፋይቶችን (በግንድና ቅርንጫፎች ላይ የሚበቅሉ ጥቃቅን አረንጓዴ ተክሎች) አጥንተናል። ጥናቱ ከጨካ ቡና ጀምሮ እስከ ዘመናዊ የቡና አመራረት ዘዴዎች ያሉትን ያካተተ ነው። በእያንዳንዱ ጣቢያ ለሶስት አመታት በቡና ማሳ ላይ የቡና ምርታማነትን ጨምሮ ሌሎችንም መረጃዎችን ሰብስበናል።

**ምን አገኘን?**

ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የዛፍ ዝረያዎች የተገኙት ዝቅተኛ የቡና ምርት ባሉባቸው ቦታዎች ነው። ነገር ግን ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ምርት ባላቸው ቦታዎች ምርቱ እየጨመረ ሲመጣ የዛፍ ዝረያዎች ቁጥር የማሽቆልቆል አዝማሚያ አልታየም (ምስል 2)። የቡና ምርት እየጨመረ ሲሄድ የግንድ አልባ እጽዋቶች እና የብራዮፋይት ዝረያዎች ብዛት አልቀነሰም። ይሁን እንጂ የግንድ አልባ ዕፅዋትና የብራዮፋይቶች የዝረያ ቅንብር በጣም ዝቅተኛ ምርት ባላቸው ቦታዎች እና ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ምርት ባላቸው መካከል ይለያያሉ።



ምስል 2. ዝቅተኛ የቡና ምርት ባለባቸው ቦታዎች የዛፍና ቁጥቋጦዎች ዝረያ ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው። ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ ቦታዎች አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ዛፎችና ቁጥቋጦዎች አሏቸው።

**መደምደሚያ፣ ምክራዊ ሐሳቦች እና ያልተመለሱ ጥያቄዎች**

ከጥናታችን መረዳት እንደተቻለው ዝቅተኛ የቡና ምርት ያላቸው ቦታዎች ከሌሎች ቦታዎች የተለየ ብዝሃ ሕይወት ያላቸው ናቸው። ይህ ማለት የነዚህን ቦታዎች እንክብካቤ በዘመን መልኩ ማጠናከር (ለምሳሌ የዛፍ ጥላ መቀነስ) በአካባቢው ያለውን የብዝሃ ሕይወት እሴት ይቀንሳል ማለት ነው። ነገር ግን፣ ከዚህ በጣም ዝቅተኛ ምርት ከምሰጡት ቦታዎች ውጪ ባሉት ማሳዎች/አካባቢዎች ከፍተኛ ምርትንና ብዝሃ ሕይወትን የማጣመር እድሎች ያሉ ይመስላል (ምስል 3)።

እዚህ ላይ የብዝሃ ሕይወት እሴቶችንና የቡና አምራቾችን ገቢ እንዴት በአንድነት ማሳደግ እንደሚቻል ዕድሎችን ማሰብ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። የቡና ምርት በተሻለ የማሳ አያያዝ (ቡና መጎንደልን ጨምሮ) ሊጨምር ይችላል። ገበሬዎች ዘላቂ የምርት ስርዓትን በሚያራምዱ ድርጅቶች እዉቅና ከገኙ ምርታቸውን በተሻለ ዋጋ በመሸጥ ገቢያቸው ሊጨምሩ ይችላሉ። የጥላ ዛፍ ዝረያዎችን ቁጥር በመጨመር እና አንዳንድ የእርሻው ክፍሎች የበለጠ ጥቅጥቅ ያለ የጥላ ዛፍ ሽፋን እንዲኖራቸው በማድረግ ብዝሃ ሕይወትን መጨመር ይቻላል።



ምስል 3. ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ምርት የሚሰጡ የቡና እንክብካቤ ዘዴዎች የቡና ምርትን ለመጨመር እና ብዝሃ ሕይወትን ለማሻሻል ዕድሎች ሊኖራቸው ይችላሉ። ዝቅተኛ ምርት ከሚሰጡ የጨካ ቡና ውጭ ባሉ አካባቢዎች ሁሉም ሰው ለዚህ ጥምር ግብ እንዲተጋ ምክራችን ነው።

ይህ ጥናት በNVR/SIDA የተደገፉ ሁለት ፕሮጀክቶች፡- “የቡና እንክብካቤ በኢትዮጵያ የገበሬዎችን ኑሮና ብዝሃ ሕይወትን ለማሳደግ” እና “በኢትዮጵያ አነስተኛ የቡና አምራች አካባቢዎችን ቀጣይነት ባለው መልኩ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ማለመድ” ላይ የተመሰረተ ሲሆን ጥናቱን የመሩት Kristoffer Hylander [kristoffer.hylander@su.se](mailto:kristoffer.hylander@su.se), Ayco Tack [ayco.tack@su.se](mailto:ayco.tack@su.se), በየነ ዘውዴ [beyu2009@gmail.com](mailto:beyu2009@gmail.com) እና ብሩክ ኢያሌው [biruk.nurahun@su.se](mailto:biruk.nurahun@su.se) ናቸው ። ለበለጠ መረጃ [www.su.se/deep](http://www.su.se/deep) ይመልከቱ።

